

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- ▶ УСТОЙЧИВ И БЕЗВРЕДЕН ИМУНОГЕНЕН ПРОДУКТ ЗА ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ ТЕРАПИЯ НА МИКРОСПОРИЯ И ТРИХОФИТИЯ ПРИ КУЧЕТА, КОТКИ, ЗАЙЦИ И НУТРИИ.
- ▶ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ ЗДРАВИ И БОЛНИ ЖИВОТНИ.
- ▶ ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ НА ВАКСИНАТА БЕЗ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ.
- ▶ СЪЗДАВА ВИСОКИ ТИТРИ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ МИКРОСПОРИЯ И ТРИХОФИТИЯ
- ▶ ИЗГРАДЕНИЯТ ИМУНИТЕТ ПРОДЪЛЖАВА ДО 1 ГОДИНА
- ▶ ЕЛИМИНИРА СЕ РИСКА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИНФЕКЦИЯ В РАЗВЪДНИКА.
- ▶ НАМАЛЯВА СТРЕСА ОТ ЕЖЕДНЕВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ С ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ.

Исклучителен представител за България
„Минтех Ко„ ЕООД

Склад: 1618 София, бул. „Каблешков“, №1

Тел.: 02 961 21 82, моб.: 0888 928 102, e-mail: k.mihnev@mintechco.bg

д-р Стойчев: 0888 534 709

Федеральное казенное

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ



предприятие

БИОФАБРИКА»

вакцина

ПОЛИДЕРМ

ЛИДЕР ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА
МИКРОСПОРИЯ И ТРИХОФИТИЯ ПО
ЖИВОТНИТЕ



Федеральное казенное

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ



предприятие

БИОФАБРИКА»

ПОЛИДЕРМ

ПОЛИВАЛЕНТНА ЖИВА ЛИОФИЛИЗИРАНА ВАКСИНА ЗА АКТИВНА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПЕВТИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВИ И БОЛНИ ЖИВОТНИ ОТ МИКРОСПОРИЯ И ТРИХОФИТИЯ ПО КУЧЕТА, КОТКИ, ЗАЙЦИ И НУТРИИ.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕРМАТОФИТОЗИТЕ:

- ▶ често срещани при домашните животни
- ▶ представляват ЗООНОЗИ – предаване заразата от животните на хората
- ▶ упорити с трудно лечение
- ▶ понижават имунитета на животните
- ▶ скъпо струващо лечение

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

ПОЛИДЕРМ – имунопрофилактика на здрави и терапевтична имунизация на болни животни срещу микроспория и трихофития.

ПОЛЗИ

- ▶ надеждна и сигурна профилактика
- ▶ отличен терапевтичен ефект
- ▶ ликвидация на опасността от гъбична зараза за хората.
- ▶ ликвидация на заразата

ЕФЕКТИВНОСТ

- ▶ ликвидиране на микотичните зоонози
- ▶ едногодишен имунитет
- ▶ лесно приложение
- ▶ ниска цена
- ▶ минимум труд



СЪСТАВ

Атенуирани култури на щам **Microsporum canis** и щам **Trichophyton mentagrophytes**

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Една доза ваксина се разтваря с 1 ml разредител (физиологичен разтвор или бидестилирана вода). Прилага се двукратно през 10-14 дни подкожно в областта на лопатката, или интрамускулно в бедрото последователно от едната и другата страна.

Начало на имунитета настъпва 25 - 30 дни след двукратно приложение. Продължителността на имунитета е 1 година.

ДОЗИРОВКА

ВИД ВЪЗРАСТ	Профилактична доза ml		Терапевтична доза ml	
	1 ^{ва} вакс.	2 ^{ра} вакс.	1 ^{ва} вакс.	2 ^{ра} вакс.
КОТКИ				
1,5-6 месеца	0,5	0,5	1,0	1,0
над 6 месеца	1,0	1,0	2,0	2,0
КУЧЕТА				
1,5-6 месеца	0,5	0,5	1,0	1,0
над 6 месеца	1,0	1,0	1,0	1,0
над 20 кг	1,0	1,0	2,0	2,0
ЗАЙЦИ				
1,5-3 месеца	0,5	0,5	1,0	1,0
над 3 месеца	1,0	1,0	2,0	2,0
НУТРИИ				
на 2 месеца	0,5	0,5	1,0	1,0